

南京安洋生物技术有限公司

荧光层析大板 目录清单

产品须知：

- ①通用尺寸：**70mm**，可定制**60-80mm**，长度**≥26cm**；
- ②该产品标记物为荧光微球，稀土铕，**365/610**波长；
- ③大板为定制产品，尺寸和加样方式非固定模式，可调整；
- ④定制需要配合提供：卡壳，底板，检测仪

序号	项目	项目简写	对标厂家	加样方式	空白线/最低检出限	线性范围	参考范围
X001	糖化血红蛋白	HbA1c大板	伯乐液相 东曹G8液相	1.全血/末梢血：5μl样本+1ml稀释液，静置60s，取100 μl加样（也可样本稀释后不静置测试）； 2.加样后5min读数（注意室温控制在15-30℃）	≤3%	3.1%-14%	4.27%-6.07%
X002	N-末端脑钠肽前体	NT-proBNP大板	罗氏	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤50pg/ml	50pg/ml-30000pg/ml	≤125pg/ml
X003	促甲状腺激素	TSH大板	罗氏	1.血清/血浆/全血：100μl样本+400μl稀释液，混合后取100μl加样； 2.加样后10min读数	≤0.1μlμ/ml	0.1μlμ/ml-60μlμ/ml	0.37μlμ/ml-5.32μlμ/ml
X004	促卵泡生成素	FSH大板	贝克曼	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后10min读数	≤0.6mlμ/ml	1mlμ/ml-200mlμ/ml	
X005	尿微量白蛋白	mALB大板	罗氏	1.尿液：100μl样本； 2.加样后10min读数	≤10mg/L	10mg/L-200mg/L	≤20mg/L
X006	B型脑钠肽	BNP大板	西门子	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤4pg/ml	5pg/ml-5000pg/ml	≤100pg/ml
X007	白细胞介素-6	IL-6大板	罗氏	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤4.8pg/ml	5pg/ml-2000pg/ml	≤10pg/ml
X008	血清淀粉样蛋白A	SAA大板	西门子	1.全血/末梢血/血浆/血清：5μl样本+1ml稀释液，取100μl加样； 2.加样后5min读数	≤2μg/ml	3μg/ml-200μg/ml	<10μg/ml

X009	肌钙蛋白T	cTnT大板	罗氏	1.血浆/血清：100μl样本+200μl稀释液，取100μl加样； 2.加样后15min读数	≤5pg/ml	5pg/ml-10000pg/ml	≤16.8pg/ml
X010	25羟基维生素D	VD大板(夹心法)	罗氏	1.全血/末梢血/血浆/血清：5 μ l样本+200 μ l稀释液，取100 μ l加样； 2. 加样后10min读数	≤4ng/ml	5ng/ml-70ng/ml	≥20ng/ml
X011	同型半胱氨酸	HCY大板	罗氏	1.血浆/血清：50μl样本+200μl稀释液，取100μl加样； 2.加样后10min读数	≤0.5μmol/l	1μmol/L-50μmol/l	5.08μmol/l-15.39μmol/l
X012	泌乳素	PRL大板	贝克曼	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤20μlμ/mL	25μlμ/mL-4000μlμ/mL	女性：72.55-600.40μlμ/mL 男性：86.30-425.72μlμ/mL
X013	抗缪勒管激素	AMH大板	罗氏	1.血浆/血清/全血：30μl样本+120μl稀释液，取100μl加样； 2.加样后10min读数	≤0.1ng/mL	0.1-50ng/mL	/
X014	心肌肌钙蛋白I	cTnI大板	雅培	1.全血/末梢血/血浆/血清：100μl样本+400μl稀释液，混匀后取100μl加样； 2.加样后10min读数	≤0.05ng/ml	0.1ng/ml-40ng/ml	≤0.3ng/ml
X015	肌红蛋白	Myo大板	贝克曼	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后10min读数	≤20ng/ml	20ng/ml-500ng/ml	≤70ng/ml
X016	肌酸激酶同工酶	CKMB大板	罗氏/西门子	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后10min读数	≤2ng/mL	2ng/mL-80ng/mL	≤5ng/mL
X017	心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白	cTnI/CKMB/Myo大板	cTnI:雅培 CKMB:罗氏/西门子 Myo: 贝克曼	1.全血/末梢血/血浆/血清：100μl样本+400μl稀释液，混匀后取100μl加样； 2.加样后10min读数	cTnI: ≤0.05ng/mL CKMB: ≤2ng/mL Myo: ≤20ng/mL	cTnI: 0.1ng/mL-40ng/mL CKMB: 2ng/mL-80ng/mL Myo: 20ng/mL-500ng/mL	cTnI: ≤0.3 ng/mL CKMB: ≤5ng/mL Myo: ≤70ng/mL
X018	心脏型脂肪酸结合蛋白	FABP大板	万孚	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后5min读数	≤1ng/mL	1ng/mL-120ng/m	≤3.49ng/mL
X019	可溶性生长刺激表达基因2蛋白	ST2大板	利德曼	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤3ng/mL	5-200ng/mL	≤35ng/mL
X020	全量程C反应蛋白	CRP大板	贝克曼	1.静脉全血、血浆和血清：5μl样本+1ml稀释液 2.加样后3min读数	≤0.48mg/L	0.5mg/L-200mg/L	超敏CRP：不高于3mg/L 常规CRP：不高于10mg/L
X021	降钙素原	PCT大板	罗氏	1.血浆和血清：取100ul样本加样 2.全血和末梢血：30ul样本+120ul稀释液，混合后取100ul加样 3.加样后15min读数	≤0.03ng/mL	0.04ng/mL-50ng/mL	不高于0.046ng/ml

X022	血清淀粉样蛋白A/全量程C反应蛋白	SAA/CRP大板	CRP:贝克曼 SAA:西门子	1.静脉全血、血浆和血清：5μl样本+1ml稀释液 2.加样后5min读数	CRP: ≤0.5μg/mL SAA: ≤2μg/mL	CRP: 0.5μg/mL-200μg/mL SAA: 2μg/mL-200μg/mL	超敏CRP: 不高于3mg/L 常规CRP: 不高于10mg/L SAA: <10μg/mL
X023	总三碘甲状腺原氨酸	TT3大板	罗氏	1.血清/血浆：100μl样本+100μl稀释液， 2.加样后10min读数	≤0.5nmol/L	0.5nmol/L-10nmol/L	1.46nmol/L-3.23nmol/L
X024	总甲状腺素	TT4大板	罗氏	1.血清/血浆：100μl样本+100μl稀释液， 2.加样后10min读数	≤10nmol/L	10nmol/L-350nmol/L	65.38nmol/L-168.60nmol/L
X025	β-人绒毛膜促性腺激素	β-HCG大板	罗氏	1.全血、血浆和血清：100μl样本+400μl稀释液 2.加样后15min读数	≤2lμ/L	4lμ/L-100000lμ/L	<5lμ/L
X026	促卵泡生成素	FSH大板	贝克曼	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤0.6mlμ/mL	1mlμ/mL-200mlμ/mL	/
X027	促黄体生成素	LH大板	贝克曼	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤1mlμ/mL	1.02mlμ/mL-200mlμ/mL	/
X028	孕酮	P大板	罗氏	1.血清/血浆：100μl样本+150μl稀释液 2.加样后10min读数	≤0.3ng/mL	0.8-50ng/mL	/
X029	胃泌素-17	G17大板	必欧翰	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤0.5pmol/L	1pmol/L-47.8pmol/L	1pmol/L-7pmol/L
X030	胃蛋白酶原 I /胃蛋白酶原 II	PGI/PGII大板	PGI: 雅培 PGII: 雅培	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后10min读数	PGI:≤10ng/mL PG II :≤5ng/mL	PGI: 10ng/mL-160ng/mL PGII: 6.25ng/mL-100ng/mL	PGI>76ng/mL 并且 PGI/PGII>3
X031	总前列腺特异抗原	TPSA大板	罗氏	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后10min读数	≤0.1ng/mL	0.1-100ng/mL	≤10.0ng/mL
X032	抗环瓜氨酸肽抗体	CCP大板	亚辉龙	1.全血、血浆和血清：10μl样本+110μl稀释液 2.加样后15min读数	≤7μ/mL	8-500μ/mL	<17μ/mL
X033	中枢神经特异蛋白	S100-β大板	中翰盛泰	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后15min读数	≤0.04ng/mL	0.04ng/mL-10ng/mL	<0.2ng/mL
X034	髓过氧化物酶	MPO大板	万孚	1.血清/血浆：100μl样本； 2.全血：100μl样本+120μl稀释液，混合后取100μl加样； 3.加样后10min读数	≤5ng/mL	10-1000ng/mL	<127ng/mL
X035	免疫球蛋白G4	IgG4大板	西门子	1.全血、血浆和血清：10μl样本+1ml稀释液，混合后取100μl加样； 2.加样后15min读数	≤0.055g/L	0.1g/L-3.3g/L	≤2.01g/L

X036	D-二聚体	D-Dimer大板	希森美康	1.血浆/全血：100μl样本+400μl稀释液，混合后取100μl加样； 2.加样后10min读数	≤0.07μg/mL	0.1μg/mL-10μg/mL	<0.5μg/mL
X037	铁蛋白	Fer大板	雅培	1.血清/血浆/全血：5μl样本+200μl稀释液，混合后取100μl加样； 2.加样后15min读数	≤5ng/mL	10-1000 ng/mL	男性：16-220ng/mL 女性：10-125ng/mL
X038	免疫球蛋白E	IgE大板	贝克曼	1.全血、血浆和血清：100μl样本+400μl稀释液，混匀后取100 μ l加样 2. 加样后10min读数	≤1μ/ml	1μ/mL-1000μ/mL	
X039	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白	NGAL大板	基蛋	1.血清/血浆/全血/尿液：5μl样本+500μl稀释液，混合后取100μl加样 2.加样后10min读数	≤50ng/ml	50ng/ml-5000ng/ml	尿液：≤100ng/ml 血清/血浆/全血：≤200ng/ml